

Оцінка потреби населення у паліативній допомозі

Методики, наявні дані,
проблеми та перспективи

1 наближення

Моделювання потреби на основі:

- наказу МОЗ України №420 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі»
- «Глобальний атлас з паліативної допомоги» (WPCSA, WHO, 2014)

Коефіцієнти

0,80 – коефіцієнт рекомендований ВООЗ для підрахунку потреби у паліативній допомозі при онкологічних захворюваннях для дорослих і дітей

Для «не-онкологічних» хронічних захворювань методичними рекомендаціями пропонується застосовувати аналогічну методологію розрахунку

«Глобальний атлас з паліативної допомоги»
(WPCSA, WHO, 2014) передбачає розрахунок
потреби для дорослих по окремих групах
захворювань

Злоякісні новоутворення	0,8
Туберкульоз	0,9
ревматоїдний артрит	0,89
хвороба Паркінсона та вторинний паркінсонізм	0,82
ВІЛ/СНІД	0,8
серцево-судинні захворювання	0,67
хронічні обструктивні захворювання легенів	0,67
цукровий діабет	0,64
захвор...	0,5
...	0,47
...	0,45

«Оцінка потреби паліативної допомоги для дітей» (ICPCN, UNICEF, 2013) рекомендує розраховувати потребу у паліативній допомозі для дітей на основі показників **поширеності захворювань**, з використанням коефіцієнту 0,67 для всіх видів захворювань, крім онкологічних, для яких застосовується коефіцієнт 0,8

Джерела даних

- форма 10, форма 12
- дані про причини смерті населення

Потреба у паліативній допомозі — дорослі, вся Україна



Методика розрахунку: згідно з Global Atlas of Palliative Care at the End of Life (WPCA, WHO, 2014)

Потреба у паліативній допомозі — діти, вся Україна



Методика розрахунку: «Оцінка потреби паліативної допомоги для дітей» (ICPCN, UNICEF, 2013)

2 наближення

Експертне обговорення «Методологія оцінки потреби в паліативній допомозі в Україні» за участі представників Міністерства охорони здоров'я, Держстату, Медстату, Мінсоцполітики, фахівців з питань паліативної допомоги.

Консультації з експертами стосовно визначення джерел даних та значень релевантних коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунків обсягу потреби.

Джерела даних

Звід сформовано 13.08.2018 15:42:13
 Форма N-12. Звіт про кільк.захв.у хвор.,прож.в рай.лік.закл.
 Форма 12 табл.1000 3 В І Т
 про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають
 в районі обслуговування лікувального закладу.
 Діти (до 14 років включно).
 Звіт. рік: 2017
 Розріз: 0 Форма в цілому (0)

№ п/п	Найменування	Зареєстровано захворювань - усього у			
		0-14 років	з них у хлопчиків	0-6 років	7-14 років
А	Б	1	2	3	4
1.0	Усі хвороби A00-T98	10 957 496	5 478 126	5 299 717	5 657 779
	Україна	0	0	0	0
	АР Крим	0	0	0	0
	Вінницька	468 235	228 823	215 216	252 019
	Дніпропетровська	268 695	134 694	133 999	140 704

Розподіл померлих за статтю, віковими

ДНІПРО (МІСЬКРАДА)
2017 рік

Причини смерті	№ рядка	Всього	в тому числі 0-27 днів			
			0	1	2	3
А	Б	1	2	3	4	
відсталість	117	0	0	0	0	
Інші розлади психіки та поведінки	118	0	0	0	0	
Інші розлади психіки та поведінки	119	23	2	0	0	
інфекційних та паразитарних хворобах	120	2	0	0	0	
Інші запальні хвороби центральної нервової системи	121	2	0	0	0	

Перелік причин смерті

Код за МКХ-10	Причина смерті	Частота
А	Б	
F72-F79	Розумова відсталість	117
F01-F09,F20-F69,F82-F99	Інші розлади психіки та поведінки	118
G00-G98	КЛАС VI. Хвороби нервової системи	119



ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ


- форми медичної статистичної звітності №10, №12;
- дані Державної служби статистики України щодо розподілу причин смерті населення;
- Реєстр пацієнтів туберкульозу Центру громадського здоров'я МОЗ;
- Національний канцер-реєстр

Еволюція методології

Комплексні показники

Новоутворення

померлі серед дорослого населення




померлі серед дорослого населення

зарєєстровані випадки ЗН

ССЗ

Смертність від серцево-судинних



Смерть від серцево-судинних - Смерть від атеросклеротична хвороба серця

Хворі на кардіоміопатію

Уточнені коефіцієнти

Дорослі

- Ревматоїдний артрит -0,79
- Серцево-судинні захворювання -0,27
- Хвороба Альцгеймера 0,53

Діти

- Вроджені вади розвитку -0,57
- Цукровий діабет -0,47
- Серцево-судинні захворювання -0,47

та інші


Труднощі методологічні

Хронічні обструктивні захворювання легень МКХ-10 J43-J47

J43	Емфізема
J45-J46	Астма та астматичний стан
J47	Бронхоектатична хвороба
J41, J42, J44	Інші хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів

Труднощі збору інформації

Смерть від старості (R54) за регіонами України у 2017 році



- різні підходи до фіксації причин смерті?
- інші фактори?

Дякую за увагу!